



UAB



AVANTAGES



Croissance



Stimule la division
cellulaire



Augmente le taux
de MS



COMPOSITION

Analyse (P/P) (à titre indicatif)

Azote (N) total 4 %

dont 3,5% d'azote organique (sang desséché, préparation en suspension à base de peptides, polypeptides d'origine végétale)

Anhydride phosphorique (P₂O₅) total 2 %

Oxyde de potassium (K₂O) sol. eau 7 %

Caractéristiques physiques

Apparence Liquide de couleur brun foncé

Densité 1,25

pH 8

Compatibilité avec d'autres produits :

Il est recommandé d'effectuer un mélange préalable pour tester la compatibilité.

Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007.



CONSEILS D'UTILISATION

- En application foliaire : 3 à 4 L / ha, dans 100 L d'eau minimum.
 - En ferti-irrigation : 0,3 à 0,8 L / hL. Bien rincer les goutteurs après utilisation du produit. Bien agiter avant l'utilisation.
- Consulter votre technicien pour des préconisations adaptées.

Respecter les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'article qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Conduisez sur ces bases la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous facteurs particuliers concernant votre exploitation tels que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales, la résistance des espèces... Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d'origine ainsi que leur conformité aux teneurs garanties. Les spécifications du produit ne peuvent être changées sans préavis.

Produit dérivé de sous-produits animaux de catégorie 3, non destiné à la consommation humaine. Interdit pour l'alimentation animale, ne pas stocker à proximité d'aliments pour animaux d'élevage. Engrais organiques ou Amendements / L'accès des animaux d'élevage aux pâturages et l'utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après application.



CONDITIONNEMENT/STOCKAGE

Bidon de 10 L

Stocker à plus de 5°C.

Produit risquant de présenter une formation de cristaux à basse température.