



NUTRITION ANIMALE

ACTROS FOIE

POUR RELANCER LE FONCTIONNEMENT HÉPATIQUE

SPÉCIALITÉS NUTRITIONNELLES & DIÉTÉTIQUES



OBJECTIFS

ACTROS FOIE favorise le bon fonctionnement du foie en assurant un meilleur démarrage en début de lactation et limitant le risque d'acétonémie et de stéatose hépatique.



UTILISATION

ACTROS FOIE s'utilise pendant les périodes cibles :

- Préparation vêlage
- Début de lactation
- Transitions alimentaires
- Avant la mise à l'herbe

ACTROS FOIE



+2.2 Kg de lait produit sur les 60 1ers jours de lactation*

*Essai réalisé en 2016 sur 36 VL en élevage

La vitamine B1 permet de stimuler le métabolisme énergétique et favorise la production laitière.

Limite les risques d'acétonémie :

- Economie de 150 – 200 € / VL / an + frais vétérinaires éventuels

Éviter les risques de baisse de performances de reproduction :

- Perte de 2,5 € / VL par point perdu en 1ere IA

Mode d'action d'ACTROS FOIE :


Du **Sorbitol** pour augmenter la synthèse et l'excrétion de la bile et améliorer l'appétence.

De la **Choline protégée** pour « **dégraissier le foie** » et plus de **Méthionine** pour compléter son action.

De la **Biotine** pour favoriser la production laitière

Un **noyau d'agents hépato-protecteurs** : Plus de méthionine et de Choline rumino-protégées.

Des extraits de plantes spécifiquement sélectionnés pour leur efficacité.



CONTITUANTS ANALYTIQUES & ADDITIFS

Constituants analytiques (%)

Protéine brute	9.5 %
Matières grasses brutes	24.5 %
Cendres brutes	37 %
Méthionine	5.45 %
Calcium	16.2 %
Cendres insolubles dans HCl	11.7 %

Vitamines

Vitamine B1 (3a821)	300 mg/kg
Biotine (3a880)	100 mg/kg
Chlorure de Choline (3a890)	100 000 mg/kg

Composés Oligo-éléments :

Cobalt (Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II) (3b304))	57 mg/kg
--	----------

Acides aminés, leurs sels et produits analogues :

DL-Méthionine, techniquement pure (3c301)	5.6 %
---	-------

Substances aromatiques

Mélange de substances aromatiques

Liants – Anti-Agglomérants :

Sépiolite (E 562)	8 400 mg/kg
-------------------	-------------

MODE D'EMPLOI

Distribuer pendant les périodes cibles : Préparer vêlage, début de lactation, transitions alimentaires, avant la mise à l'herbe

Vaches laitières :

- 200 g / j pdt 10 jour, une fois / mois

Bovins viande :

- 100 à 200 g / j pdt 10 jours, une fois / trimestre

Cet aliment contient de la choline rumino-protégée.

Conditionnement : Seau de 15kg