

# SPÉCIALITÉS NUTRITIONNELLES & DIÉTÉTIQUES

🌃 P É P I T





# ARGIVO SE, un concentré d'efficacité:

- Pour stimuler l'appétit, augmenter l'ingestion et réduire la perte de poids.
- Pour rééquilibrer le lait
- Pour favoriser le bon démarrage de l'animal
- Aromatisation spécifique jeunes ruminants pour une ingestion régulière et spontanée.



## UTILISATION

- ARGIVO SE, une utilisation facile:
- Mettre à disposition aux animaux dès le jour de la naissance et à chaque transition alimentaire, en particulier, au démarrage, au sevrage ou à l'allotement pour les jeunes ruminants.
- Distribution en libre service.

# SPÉCIALITÉS NUTRITIONNELLES & DIÉTÉTIQUES

# **ARGIVO Se**



Aromatisation spécifique reprenant l'odeur lactée qui attire naturellement le veau Un apport de sucres important (15%)

Des extraits végétaux (fibres et gomme) et de l'argile qui ont un très fort pouvoir de rétention d'eau et permettent ainsi un transit régulier.

Des extraits de paroi de levures (Manan Oligo Saccharides) qui piègent certaines bactéries et les évacuent dans les fèces.

Des vitamines et des oligo-éléments pour rééquilibrer le lait.







#### COMPOSITION

Sorbitol, sucre, caroubes, produits dérivés de levures, sel.

Constituants	analy	/tiq	ues	
	_	_		

Cendres Insolubles dans HCl
Calcium
Phosphore
Sodium
Magnésium
45,9 %
1,4 %
0 %
1,2 %
1 %

#### **Vitamines**

tot. Racémique) 2 000 mg

Liants

1m558i Bentonite 500 000 mg

E559 Argile kaolinitique exempte d'amiante 143 600 mg

3a700 Vitamine E (acétate d'alpha tocophéryle

# Oligo-éléments

3b202 lode (iodate de calcium anhydre) E8 Sélénium (sélénite de sodium) 3B8.12 Sélénium (sélénométhionine CNCM I-3399)

100 mg/kg 9 mg/kg 1mg/kg

## **Substances aromatiques**

Mélange de substances aromatiques

#### MODE D'EMPLOI

Mettre à disposition des animaux dès le jour de la naissance et à chaque transition alimentaire, en particulier au démarrage, au sevrage ou à l'allotement pour les jeunes ruminants.

**Veaux d'élevage :** 50 g par jour pendant 3 semaines **Agneaux / chevreaux :** 20 g par jour pendant 15 jours.

A la mise à l'herbe (bovins adultes) : 150 g / jour. Commencer une semaine avant et poursuivre une semaine après.