



ACCESSO

RAY-GRASS ANGLAIS

TARDIF début de groupe

TÉTRAPLOÏDE



ESPÈCE

RAY-GRASS ANGLAIS

PRÉCOCITÉ

TARDIF début de groupe

PLOÏDIE

TÉTRAPLOÏDE



» MORPHOTYPE :

- Port : Assez gazonnant
- Finesse du feuillage : Assez large
- Couleur du feuillage : Vert foncé brillant

» PRÉCOCITÉ :

- Date de départ en végétation : 03/04
- Date de début d'épiaison : 30/05
- Souplesse d'exploitation : 62 jours

Source HERBE BOOK 2019

» PRODUCTIVITÉ (t M.S./ha) :

- Production 1^{ère} coupe : 1,7
- Production de printemps : 6,2
- Production été / automne : 2,9
- Production annuelle totale : 9,1

Source HERBE BOOK 2019

» CARACTÉRISTIQUES QUALITATIVES :

- Remontaison : 2,6
- Résistance aux maladies
 - Rouille 7,4
 - Helminthosporiose 6,5

Source HERBE BOOK 2019

Notations de 1 à 9. 9 : le caractère s'exprime fortement

» PÉRENNITÉ :

7,6

Source HERBE BOOK 2019

Notations de 1 à 9. 9 : le caractère s'exprime fortement

» AIRE DE CULTURE :

- Régions maritimes
- Nord France

» DESTINATION :

- Essentiellement pâture
- Fauche possible à fin mai

» PRÉCONISATIONS SEMIS (kilos / ha) :

- En pur : 30/35
- En association : 3/4 trèfle blanc
- En mélange avec RGA diploïde : 60% ACCESSO + 40 % Diploïde